

FUNGICIDEN							Update : Juli 2024		
Werkzame stof(fen)	Formulering	Handelsnaam	Erkenningsnummer	Dosis (l/h of kg/ha)	Max aantal toepassingen/jaar	Bufferzone (m)	Veiligheidsster mijn(j)	Opmerking	
difeconazool 250g/l	EC	DIFCOR 250 EC	9454P/B	0,5	3	1	21	Met een interval van ten minste 14 dagen tussen 2 behandelingen. Toepassingsstadium : $\geq$ BBCH 39 (sluiten van rijen: ongeveer 90% van planten in naast elkaar liggende rijen raken elkaar)	
		DIFCO	32778P/P	0,5	3	1	21		
		DIFELCOZOR 250	34340P/P	0,5	3	1	21		
		DIFURE SOLO	11050P/B	0,5	2	5	21		
		GEYSER	8256P/B	0,5	3	1	21		
		INTER DIFENOCONAZOLE 250	32530P/P	0,5	3	1	21		
		MAVITA 250 EC	10715P/B	0,5	3	1	21		
		PROFI DIFENO 250 EC	11135P/B	0,5	3	1	21		
		SQUARE 250 EC	10785P/B	0,5	3	1	21		
		TAPIER	9477P/B	0,5	3	1	21		
		TAPIER 250 EC	10496P/B	0,5	3	10	21	Met een interval van ten minste 14 dagen tussen 2 behandelingen. Toepassingsstadium $\geq$ BBCH 31 (begin sluiten rijen: 10% van planten in naast elkaar liggende rijen raken elkaar)	
difeconazool 500 g/l	SC	CURRANDO	28432P/B	0,25	2	20	21	Met een interval van ten minste 14 dagen tussen 2 behandelingen. Toepassingsstadium 20% van planten in naast elkaar liggende rijen raken elkaar - bietenwortel heeft oogstgrootte bereikt (BBCH 32-49)	
		BEETELCO 500	33795P/P						
difeconazool 125g/l + azoxystrobine 125g/l	SC	ANGLE	11138P/B	1	2	5	35	Met een interval van ten minste 21 dagen tussen 2 behandelingen. Toepassingsstadium : Voor zwartrot (1 toepassing) : begin sluiten rijen: 10% van planten in naast elkaar liggende rijen raken elkaar - sluiten van rijen: ongeveer 90% van planten in naast elkaar liggende rijen raken elkaar (BBCH 31-39) Voor cercospora, ramularia, echte meeldauw en roest (1 tot 2 toepassingen) : sluiten van rijen: ongeveer 90% van planten in naast elkaar liggende rijen raken elkaar - bietenwortel heeft oogstgrootte bereikt (BBCH 39-49)	
		BICANTA	10894P/B						
		QUADRIS GOLD	10900P/B						
difeconazool 100g/l + fenpropidin 375g/l	EC	SPYRALE	8860P/B 1401 P/P	1	1	20	28	Met 90% driftreducerende techniek.	
mefentrifluconazool 75g/l	SC	BELANTY	11216P/B	1,5	2	1	28	Met een interval van ten minste 14 dagen tussen 2 behandelingen. Toepassingsstadium sluiten van rijen: ongeveer 90% van planten in naast elkaar liggende rijen raken elkaar - bietenwortel heeft oogstgrootte bereikt (BBCH 39-49)	
		DYNERGY	11217P/B						
		MEFENTRIFELCO	29548P/P 33657P/P						
		VELARY	11218P/B						
fluxapyroxad 50g/l + méfentrifluconazole 100g/l	EC	REVYSTAR GOLD	11085P/B	1	2	1	28	Met een interval van ten minste 14 dagen tussen 2 behandelingen. Toepassingsstadium sluiten van rijen: ongeveer 90% van planten in naast elkaar liggende rijen raken elkaar - bietenwortel heeft oogstgrootte	
		VERYDOR	11101P/B	1	2	1	28		
tetraconazool 125g/l	ME	BELROSE	9897P/B	0,8	2	1	42	Met een interval van ten minste 20 dagen tussen 2 behandelingen	
		EMINENT	9566P/B						
		RIVIOR	11156P/B						
		GALILEO	28232P/B						
		TETRACONAZOL 125	24564P/P						
metconazool 90g/l + prothioconazool 250g/l	EC	PANORAMA	31120P/B	0,6	1	1	28	BF met minimum 50% driftreducerende techniek. Toepassingsstadium sluiten van rijen: ongeveer 90% van planten in naast elkaar liggende rijen raken elkaar - bietenwortel heeft oogstgrootte bereikt (BBCH 39-49)	
zwavel 80%	WG	BIOSOON 80 WG	1252P/B	7,5	4	1	-	Preventieve behandeling tegen witziekte, met een interval van 7-14 dagen tussen 2 behandelingen	
		KUMULUS WG	9185P/B						
		COSAVET	8775P/B	7,5	4	1	-	Preventieve behandeling tegen witziekte	
		HERMOVIT	6676P/B						
		POL-SULPHUR 80 WG	10672P/B	7,5	3	1	14	Preventieve behandeling tegen witziekte, met een interval van ten minste 10 dagen tussen 2 behandelingen	
THIOVIT JET	5700P/B	7,5	2	1	-	Preventieve behandeling tegen witziekte, met een interval van 14-21 dagen tussen 2 behandelingen			
zwavel 80%	WP	POL-SULPHUR 80 WP	10671P/B	7,5	3	1	14	Preventieve behandeling tegen witziekte. Met een interval van ten minste 10 dagen tussen 2 behandelingen	
zwavel 825g/l	SC	MICROTHIOL SPECIAL LIQUID	10929P/B	7,3	2	5	3	Preventieve behandeling. Toepassingsstadium sluiten van rijen: ongeveer 90% van planten in naast elkaar liggende rijen raken elkaar - bietenwortel heeft oogstgrootte bereikt (BBCH 39-49).	
zwavel 800g/l	SC	FLOSUL	11022P/B	7,5	2	1	3	Met een interval van ten minste 15 dagen tussen 2 behandelingen	
Bacillus amyloliquefaciens strain QST 713 13,96g/l	SC	SERENADE ASO	10299P/B	4	4	1	-	Toepassingsstadium begin sluiten rijen: 10% van planten in naast elkaar liggende rijen raken elkaar - bietenwortel heeft oogstgrootte bereikt (BBCH 31-49) Met een interval van 5 dagen tussen 2 behandelingen	
<b>120 dagen toelatingen voor noodsituaties</b>									
fluopyram 125g/l + prothioconazool 125 g/l	SE	PROPULSE	3146P/B/120	1,2	2	5	42	Toepassingsstadium begin sluiten rijen: 10% van planten in naast elkaar liggende rijen raken elkaar - bietenwortel heeft oogstgrootte bereikt (BBCH 31-49) toepassingen met een interval van ten minste 21 dag(en) tussen twee toepassingen	
		PROPYRAM 250 SE	34214P/B/120						
		INTER BLAST	34216P/B/120						
		YEARLING	34211P/B/120						